



Fertilizante Organomineral

 **Aminoterra®**

Aminoterra® é um **poderoso fertilizante e bioestimulante líquido**, obtido a partir de proteínas de origem marinha (Salmão), hidrolisada enzimaticamente em condições controladas com alta tecnologia.

Este avançado processo permite a obtenção de um produto estável, rico em aminoácidos livres e polipeptídeos de cadeia curta.

O **Aminoterra®** é de fácil absorção via foliar e radicular, permitindo que as plantas construam suas próprias proteínas e tecidos de forma rápida e com **grande economia de energia**, especialmente em ambientes com estresse do tipo nutricional, térmico, hídrico, luminoso ou salino.



Indicado para Culturas

Café, Soja, Milho, Feijão, Algodão, Amendoim, Cana-de-açúcar, Fruticultura, Olericultura, HortiFruti (HF), Pastagens, Eucalipto

Composição e especificação

Composição	% P/P
Nitrogênio total (N-Total)	3
Fósforo (P2O5)	1
Carbono Orgânico	10
Solubilidade em água	94% a 20°C
pH	3,5
Densidade	1,1 g/L a 20°C




aminochem
From the sea. For your crops.



CULTIVOS	DOSES FOLIAR (L/ha)	DOSE FERTIRRIGAÇÃO (L/ha)	FORMA DE APLICAÇÃO
Culturas anuais (Soja, Milho, Trigo e Feijão)	2,0 a 5,0		Realizar de 1 a 2 aplicações em fase de crescimento vegetativo e de 1 a 2 aplicações em fase reprodutiva.
Café	2,0 a 8,0	5,0 a 20,0	Aplicação pós-plantio ou em regeneração de lavoura até o segundo ano (3 a 6 aplicações). Aplicação ao longo da linha / saia, na projeção da copa, via Fertirrigação ou Drench (3 a 6 aplicações).
Cana-de-açúcar	2,0 a 10,0	5,0 a 20,0	Aplicação pós-plantio até o primeiro ano (3 a 6 aplicações). Aplicação ao longo da soqueira, via Fertirrigação ou Drench (3 a 6 aplicações).
Eucalipto	2,0 a 8,0	5,0 a 20,0	
Frutíferas (banana, maçã, marmelo, pêra), Carosços (ameixa, cereja, nectarina, pêssego), Frutos Secos (amendoim, avelã, noqueira), Videiras (mesa, viníferas), Kiwi	3,0 a 5,0	5,0 a 10,0	Doses por semana, desde o início de brotação, durante 6 a 12 semanas
Citricos (lajanja, limão, tangerina, ponkan, clementinas), Acacate, Oliveira e Romã	3,0 a 5,0	5,0 a 10,0	Doses por semana, desde o início de brotação, durante 6 a 12 semanas
Estabelecimento de Videiras e Frutíferas	3,0 a 5,0	5,0 a 6,0	Doses por semana, desde o início de brotação, durante todo o período de crescimento vegetativo
Frutíferas de menor estatura (amora, cranberry, framboesa, mirtilo, morango)	3,0 a 5,0	5,0 a 10,0	Doses por semana, desde o início de brotação, durante 10 a 12 semanas
Vegetais de Folha / Caule (acelga, alface, repolho, salsão) Legumes de Bulbo (beterraba, cenoura, chicória, rabanete) Legumes de Flor (alcachofra, brócolis, couve-flor) Legumes de fruto (melão, melancia, pepino, tomate)	3,0 a 5,0	4,0 a 8,0	Doses por semana, a partir de 7 dias de pós-transplante, ou pós-emergência, durante 6 a 10 semanas

* Produto de aplicação foliar. As doses e momentos de aplicação são sugestões, não representando necessariamente uma recomendação geral. A empresa não se responsabiliza por manejo inadequado e/ou mal uso do produto, assim como efeitos adversos derivados. Para uma correta dosagem, recomenda-se consultar um Engenheiro Agrônomo.

RECOMENDAÇÕES

Para uso foliar em espécies frutíferas, sugere-se o uso de uma concentração de 0,3% ~ 0,5% da solução total.
Para uso foliar em culturas anuais ou aplicações de baixo volume, aplicar uma concentração máxima de 5%.
Recomenda-se um intervalo de 48 horas sem irrigação pós-aplicação.
Recomenda-se não aplicar o produto em horário de grande insolação e/ou em altas temperaturas.
A calda deverá sempre ser agitada vigorosamente, buscando-se homogeneidade, antes da aplicação.

