

FICHA TÉCNICA



INGREDIENTE ATIVO	Nitrogênio, Carbono Orgânico
NOME QUÍMICO	Matéria Orgânica, Ácidos Orgânicos.
GRUPO QUÍMICO	Hidrolisado Proteico + Ácidos Graxos Ômega 3, 6 e 9.
CONCENTRAÇÃO E FORMULAÇÃO	Nitrogênio Total (1%), Carbono Orgânico (60%); Concentrado Emulsionável.
MODO DE AÇÃO	Fertilizante e Bioestimulante Foliar
FORMULADOR	Aminocompany Fertilizers and Chemicals S.A
DISTRIBUIDOR	Nanoquímica Indústria e Comércio Ltda.
TOXICIDADE	Não Tóxico.
ANTÍDOTO	Tratamento Base.

Bioil-S® é um óleo natural, obtido a partir de um processo de hidrólise enzimática de proteínas de origem marinha (Salmão), realizado em condições controladas de alta tecnologia. Este processo avançado permite a obtenção de um produto estável, com propriedades bioestimulantes e antioxidantes, que promove o desenvolvimento das defesas das plantas. Suas propriedades bioestimulantes e antioxidantes reduzem o estresse das plantas. Composto principalmente por ácidos graxos poli-insaturados Ômega.

As plantas que possuem proteínas e ácidos graxos Ômega constantemente durante seu ciclo, não só melhoram sua resistência e adaptação a todos os tipos de ambientes, como também aumentam sua capacidade de síntese de hormônios naturais de crescimento, com consequente aumento no potencial produtivo e qualidade de todos os tecidos (raízes, folhas, caules, flores e frutos).

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE USO FOLIAR

CULTIVOS	DOSES L/ha	FORMA DE APLICAÇÃO
Frutíferas: Macieiras - Pereiras - Marmelos - Ameixas - Pessegueiros - Nectarinas - Cerejeiras - Nogueiras - Amendoeiras - Avelãs - Videiras (Viníferas - Uvas de Mesa) - Kiwis.	0,25 a 5	Doses por semana desde início de brotação. (3 a 6 aplicações).
Cítricos (Limoeiros - Laranjeiras - Tangerineiras); Abacateiros; Oliveiras.	0,25 a 5	Doses por semana desde início de brotação. (3 a 6 aplicações).
HF.	0,25 a 5	Associado às aplicações foliares e fitossanitárias e controle químico de ervas daninhas.
Café.	0,25 a 2	Associado às aplicações foliares e fitossanitárias e controle químico de ervas daninhas.
Cana-de-açúcar.	0,25 a 5	Dessecação. Associado às aplicações foliares e fitossanitárias.
Eucalipto.	0,25 a 2	Associado às aplicações foliares e fitossanitárias e controle químico de ervas daninhas.
Culturas Anuais (Verão e Inverno).	0,25 a 1	Dessecação. Associado às aplicações foliares e fitossanitárias.

*As doses e momentos de aplicação são sugestões, não representando necessariamente uma recomendação geral. A empresa não se responsabiliza por um mal manejo e uso, assim como os efeitos adversos derivados. Para uma correta dosagem consulte um Engenheiro Agrônomo.

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE USO FOLIAR

Não aplicar em horas de grande insolação ou altas temperaturas.
As doses recomendadas devem representar entre 0,25% - 1% da solução.

CARACTERÍSTICAS BIOIL-S®

Bioil-S® fortalece e recupera as plantas submetidas a situações de estresse (Reduzindo perdas de potencial produtivo).

Bioil-S® induz a formação de plantas mais saudáveis, resistentes e vigorosas.

Bioil-S® favorece o carregamento de moléculas e nutrientes.

INSTRUÇÕES GERAIS DE MANEJO

- Em aplicações foliares utilizar água suficiente para deixar bem coberto.
- Não aplicar diretamente o produto sem diluição prévia.
- Deixar passar pelo menos 7 dias sem aplicações de produtos cúpricos e sulfurados, após a aplicação.
- Não gera espuma.
- Não misturar com enxofre. Em caso de dúvidas, realize testes de compatibilidade antes da aplicação.
- Produto natural, concentrado, não tóxico para pessoas ou animais e não corrosivo.
- Produto estável em condições normais de armazenamento. Não causa reações químicas com seu recipiente.
- Manter o produto armazenado em tambores fechados, em locais frescos e secos, longe do alcance de animais. Depois de aberto, utilizar completamente.
- Recipientes: Embalagens de 1 L, 5 L, 20 L em material HDPE (Polietileno de alta densidade), com lacre de segurança altamente resistentes; e tambores IBCs de 1.000 L.
- Não reutilizar a embalagem vazia.